



SUSPENSION



BLATTDÜNGUNG

ÖKOLOGISCHER
LANDBAU

Calcina

BIOLOGISCHER BLATTDÜNGER MIT CALCIUM, BOR UND GLYCIN-BETAIN ZUR GEZIELTEN MANGELKORREKTUR UND QUALITÄTSSTEIGERUNG DER BLÄTTER UND FRÜCHTE

BESCHREIBUNG

Viovera® Calcina ist eine hochkonzentrierte natürliche Suspension mit Glycin-Betain, Calcium und Bor.

Viovera® Calcina unterstützt Pflanzen bei biotischem und abiotischem Stress und kann die Haltbarkeit nach der Ernte verbessern.

Der hohe Calciumgehalt in **Viovera® Calcina** stärkt Zellwände und Zellmembranen und fördert so Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Lagerfähigkeit von Obst und Gemüse. Bor unterstützt zusätzlich Fruchtwachstum und Gewebefestigkeit und kann das Risiko des Aufplatzens reduzieren.

VORTEILE

- verbessert die Pflanzengesundheit und das Wachstum unter Stressbedingungen
- stimuliert die natürliche Pflanzenabwehr gegen Krankheitserreger
- hoher Kalziumgehalt reduziert oder verhindert Kalziummangelkrankheiten
- fördert die Lagerqualität und Haltbarkeit von Obst und Gemüse

INHALT

Calciumsuspension mit Bor und Glycin-Betain.
Für die Blattdüngung

%w/w			g/l
15	CaO	Calcium	210
0,9	B	Bor	12,6

Alle Inhalte sind wasserlöslich.

EIGENSCHAFTEN

Dichte: 1,4 g/cm³

pH-Wert: 1,4

Farbe: dunkelbraun


SUSPENSION

BLATTDÜNGUNG

**ÖKOLOGISCHER
LANDBAU**

Calcina

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Kultur	Zweck der Anwendung	Anzahl u. Zeitpunkt der Aufbringung	Dosierung
Kernobst	Zur Stippebekämpfung u. Verbesserung der Fruchtqualität	mehrmalig/ wöchentlich Fruchtansatz bis Ernte	3 – 5 l/ha
Steinobst		3 während Spaltstress	5 l/ha
Erdbeeren	Verbesserung der Frucht- festigkeit und Lagerstabilität	2 – 3 gemeinsame Anwendung mit Botry- ziden / Vor der Ernte	3 l/ha
Traufeltrauben		2 – 3 zw. Erbsengröße und Traubenschluss	3 l/ha
Fruchtgemüse	Vorbeugend gegen Blütenendfäule, Verbesserung der Frucht- festigkeit, Lager- und Transportstabilität	3 – 5 Abstand von 7 – 10 Tage ab Ende Blüte bis Ernte	5 l/ha
Kartoffel	Verbesserung der Knollen- und Schalenqualität, Lager- und Transportstabilität	3 ab Reihenschluss	5 l/ha

Viovera® Calcina kann im Spritz- und Sprühverfahren zusammen mit Pflanzenschutzmitteln angewendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HAFTUNG

Temperaturen unter +5 °C und über +35 °C sowie häufige Temperaturschwankungen bei Transport und Lagerung sollten vermieden werden. Zu niedrige Temperaturen können zur Auskristallisation führen. Diese Kristalle sind vollständig wasserlöslich und lösen sich in der Sprühlösung wieder auf. Bei längerer Lagerung kann es zu Farbveränderungen kommen. Weder Kristallisation noch Farbveränderung beeinträchtigen die gewünschte physiologische Produktqualität in irgendeiner Weise. Beim erstmaligen Mischen mit anderen Produkten ist vor der allgemeinen Anwendung ein Test in kleinem Maßstab durchzuführen. Da Lagerung und Anwendung von Düngemitteln außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die zufriedenstellende Qualität des Produkts zum Zeitpunkt der Lieferung haften.

® = Eingetragene Marke